

100
AÑOS



CATÁLOGO
TÉCNICO
2020

KLEIN NUEVA VARIEDAD **CIEN AÑOS**



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W

INTERMEDIO A LARGO

NO

MEDIA

NO

NO

ALTO

RESISTENTE

1

IIS

IV

12,1

11,6

28,0

26,5

80,3

79,5

283

327

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

 Zona de adaptación para cada variedad

BAJO



BAJO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

 PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	MAY			JUN			JUL			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										200 a 260
II Norte										220 a 260
II Sud										220 a 280
III										220 a 260
IV										220 a 280
V Norte										200 a 280
V Sud										180 a 240

 **KLEIN**
EL NOMBRE DEL TRIGO

www.trigoklein.com.ar

100
AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD **MERCURIO**



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W

INTERMEDIO A LARGO

NO

MEDIA

NO

NO

ALTO

RESISTENTE

1

IIS

IV

12,3

12,6

28,5

28,9

80,9

80,2

452

444

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

 Zona de adaptación para cada variedad

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

 PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	MAY			JUN			JUL			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
I										200 a 260
II Norte										220 a 260
II Sud										220 a 280
III										220 a 260
IV										220 a 280
V Norte										200 a 280
V Sud										180 a 240

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD MINERVA



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W

INTERMEDIO A LARGO

NO

MEDIA

NO

NO

ALTO

RESISTENTE

1

IIS

IV

12,0

12,8

29,0

30,4

81,4

81,1

273

366

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad

BAJO

BAJO

BAJO


BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	MAY			JUN			JUL			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
I										200 a 260
II Norte										220 a 260
II Sud										220 a 280
III										220 a 260
IV										220 a 280
V Norte										200 a 280
V Sud										180 a 240

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD TITANIO CL



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W

INTERMEDIO A LARGO

NO

MEDIA

NO

NO

ALTO

RESISTENTE

2

IIS

IV

13,2

13,2

32,1

30,5

81,4

80,6

226

316

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	MAY			JUN			JUL			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
I										200 a 260
II Norte										220 a 260
II Sud										220 a 280
III										220 a 260
IV										220 a 280
V Norte										200 a 280
V Sud										180 a 240

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD PROMETEO



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W

INTERMEDIO A CORTO

NO

ALTA

NO

NO

MEDIO

RESISTENTE

1

IIS

IV

13,2

13,7

33,6

32,6

80,6

78,2

377

432

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO


BAJO

BAJO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										200 a 260
II Norte										220 a 260
II Sud										220 a 280
III										220 a 260
IV										220 a 280
V Norte										200 a 280
V Sud										180 a 240

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD PROTEO



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEINA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W

INTERMEDIO A CORTO

NO

MEDIA

NO

NO

ALTO

RESISTENTE

1

IIS

IV

14,3

15,1

40,9

39,1

82,7

80,7

379

420

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad

BAJO



ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										200 a 260
II Norte										220 a 260
II Sud										220 a 280
III										220 a 260
IV										220 a 280
V Norte										200 a 280
V Sud										180 a 240

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD **LIEBRE**



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W

INTERMEDIO A CORTO

NO

MEDIA

NO

NO

BAJO

RESISTENTE

3

IIS

IV

12,5

13,2

33,7

34,5

80,0

80,5

168

242

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										200 a 260
II Norte										220 a 260
II Sud										220 a 280
III										220 a 260
IV										220 a 280
V Norte										200 a 280
V Sud										180 a 240

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD **POTRO**



CICLO VEGETATIVO
VERNALIZACIÓN
SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO
COMPORTAMIENTO
VUELCO
DESGRANE
ALTURA
BROTADO
CALIDAD*
GRUPO DE CALIDAD
PROTEÍNA
GLÚTEN HÚMEDO
PH
W


CORTO	
NO	
MEDIA	
NO	
NO	
BAJO	
RESISTENTE	
1	
IIS	IV
12,6	12,9
32,8	32,9
80,4	79,8
357	358

SANIDAD**
ROYA ANARANJADA
ROYA AMARILLA
ROYA NEGRA
SEPTORIA
MANCHA AMARILLA
FUSARIUM
COMERCIALIZACIÓN

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
 

ZONA DE ADAPTACIÓN

 Zona de adaptación para cada variedad



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

 PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										280 a 320
II Norte										280 a 320
II Sud										280 a 350
III										280 a 320
IV										280 a 350
V Norte										280 a 320
V Sud										250 a 300





www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD VALOR



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN

SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO

DESGRANE

ALTURA

BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA

GLÚTEN HÚMEDO

PH

W

CORTO

NO

MEDIA

NO

NO

MEDIO

RESISTENTE

1

IIS

IV

13,0

13,0

34,9

33,0

77,6

77,7

277

304

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA

ROYA AMARILLA

ROYA NEGRA

SEPTORIA

MANCHA AMARILLA

FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

BAJO


BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										280 a 320
II Norte										280 a 320
II Sud										280 a 350
III										280 a 320
IV										280 a 350
V Norte										280 a 320
V Sud										250 a 300

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD NUTRIA



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN

SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO

DESGRANE

ALTURA

BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA

GLÚTEN HÚMEDO

PH

W

CORTO

NO

BAJA

NO

NO

MEDIO

RESISTENTE

2

IIS

IV

13,0

13,1

33,5

34,4

82,4

80,9

156

209

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA

ROYA AMARILLA

ROYA NEGRA

SEPTORIA

MANCHA AMARILLA

FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										280 a 320
II Norte										280 a 320
II Sud										280 a 350
III										280 a 320
IV										280 a 350
V Norte										280 a 320
V Sud										250 a 300

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD **RAYO**



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN

SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO

DESGRANE

ALTURA

BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA

GLÚTEN HÚMEDO

PH

W

CORTO

NO

BAJA

NO

NO

MEDIO

RESISTENTE

1

IIS

IV

13,6

13,1

32,8

34,5

78,2

77,2

325

373

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA

ROYA AMARILLA

ROYA NEGRA

SEPTORIA

MANCHA AMARILLA

FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad

ALTO



ALTO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										280 a 320
II Norte										280 a 320
II Sud										280 a 350
III										280 a 320
IV										280 a 350
V Norte										280 a 320
V Sud										250 a 300

100 AÑOS



www.trigoklein.com.ar

KLEIN VARIEDAD **TAURO**



CICLO VEGETATIVO

VERNALIZACIÓN

SENSIBILIDAD AL FOTOPERÍODO

COMPORTAMIENTO

VUELCO

DESGRANE

ALTURA

BROTADO

CALIDAD*

GRUPO DE CALIDAD

PROTEÍNA

GLÚTEN HÚMEDO

PH

W

CORTO

NO

BAJA

NO

NO

ALTO

RESISTENTE

2

IIS

IV

12,8

12,8

33,0

32,8

79,4

78,9

226

282

SANIDAD**

ROYA ANARANJADA

ROYA AMARILLA

ROYA NEGRA

SEPTORIA

MANCHA AMARILLA

FUSARIUM

COMERCIALIZACIÓN

ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona de adaptación para cada variedad

BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO



CUADRO DE FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

Las fechas tempranas corresponden a las zonas más al Norte de cada subregión. Las densidades bajas corresponden a las siembras más tempranas y las altas a las más tardías.

PERÍODO DE SIEMBRA RECOMENDADO

SUBREGIÓN	ÉPOCA DE SIEMBRA									SEMILLAS VIABLES POR M2.
	JUN			JUL			AGO			
	10	20	30	10	20	30	10	20		
I										280 a 320
II Norte										280 a 320
II Sud										280 a 350
III										280 a 320
IV										280 a 350
V Norte										280 a 320
V Sud										250 a 300

100 AÑOS

*Datos obtenidos en las campañas 2016-17-18, en la localidad de Plá para la subregión IIS y Balcarce para la IV.

GRUPO CALIDAD

Es la caracterización que realiza el Comité de Cereales de Invierno de la CONASE al momento de incluir la variedad en el Régimen de Fiscalización y toma en cuenta valores de Calidad Comercial y Calidad Industrial.

Grupo 1: Trigos correctores, aptos para Panificación Industrial.

Grupo 2: Trigos aptos para Panificación Tradicional, con más de 8 horas de fermentación.


Grupo 3: Trigos aptos para Panificación Tradicional, con menos de 8 horas de fermentación.

*Para acceder a toda la información más completa
y actualizada visite nuestra web y síguenos en las redes sociales*

www.trigoklein.com.ar



MAPA DE SUBREGIONES TRIGUERAS



LOCALIDADES
ENSAYOS DE EVALUACIÓN

** El criadero ha creído conveniente realizar su propio análisis para confeccionar el Perfil Sanitario de sus variedades, para lo cual ha tomado en cuenta la información obtenida en sus ensayos de micro y macroparcels, y otras fuentes externas donde se hicieron observaciones sanitarias.

Es importante la forma de interpretar esta información:

BAJO

Indica que hasta el momento **no hay razones para pensar que puede haber un ataque de importancia.**

MEDIO

Debe monitorearse más frecuentemente el cultivo, pues genéticamente no hay suficiente resistencia y, si las condiciones de ambiente son favorables y hay inóculo, puede haber ataques de importancia.

ALTO

El rango alto indica que han ocurrido ataques de importancia en varias condiciones. Por lo que es casi seguro que habrá que **realizar aplicaciones de protección.**



Recomendamos repartir el área a sembrar entre dos o más variedades de distinta fecha y curar las semillas antes de la siembra contra carbores (Tilletia spp y Ustilago spp).

La resistencia a enfermedades de los cultivares indicada en este folleto corresponde a las observaciones a campo efectuadas en los últimos años y puede variar en el futuro debido a la aparición de nuevas razas o biotipos de las enfermedades.

Criadero Klein, 100 años dedicados al Trigo.



100 AÑOS DE TRIGO



KLEIN
EL NOMBRE DEL TRIGO



Plá, Partido de Alberti, Buenos Aires
Tel/Fax: (54) 02346 499701 / 702 / 703
klein@trigoklein.com.ar

www.trigoklein.com.ar



El reconocimiento a la Propiedad Intelectual mediante al pago de la Regalía Extendida es fundamental para la continuidad de todas las tareas de investigación y el lanzamiento de variedades superadoras, que beneficiaran directamente al productor.


Las variedades de Trigo se comercializan bajo el sistema de regalías extendidas, por el cual todo aquel que guarde semilla para "uso propio" de alguna de estas variedades, deberá abonar una regalía por aquellas bolsas que siembre en la siguiente campaña.

Trigo Klein:

El monto de la regalía por uso propio será equivalente a diez (10) kilogramos de trigo por cada cien (100) kilogramos de semilla sembrada, para las variedades de trigo KLEIN CHAJA, KLEIN DELFIN, KLEIN ESCUDO, KLEIN FLECHA, KLEIN JABALÍ, KLEIN MARTILLO, KLEIN PROTEO y KLEIN SAGITARIO.

Dicho monto será equivalente a doce (12) kilogramos de trigo por cada hectárea sembrada, para las variedades KLEIN CASTOR, KLEIN CAPRICORNIO, KLEIN CARPINCHO, KLEIN GAVILAN, KLEIN GLADIADOR, KLEIN GUERRERO, KLEIN LEON, KLEIN NUTRIA, KLEIN PANTERA, KLEIN RAYO, KLEIN TAURO, KLEIN YARARA, KLEIN ZORRO, KLEIN ROBLE y KLEIN FLAMENCO.

Para las variedades KLEIN SERPIENTE, KLEIN TITANIO CL, KLEIN PROMETEO, KLEIN LANZA, KLEIN MERCURIO, KLEIN HURACAN, KLEIN MINERVA, KLEIN POTRO, KLEIN VALOR y KLEIN CIEN AÑOS el monto de la regalía será de U\$S 4 por cada hectárea sembrada.



CRIADERO KLEIN S.A. Plá, Partido de Alberti (BA). TEL.: (02346) 499701 al 04 (líneas rotativas) klein@trigoklein.com.ar

L. Adm. Rodolfo Klein CEL.: (02346) 15457800 rodolfoklein@trigoklein.com.ar /// **ASESORES TÉCNICOS:** Ing. Agr. Félix Sammartino Cel. (02346) 15516323

felixsammartino@trigoklein.com.ar / Ing. Agr. Ladislao Caputo Cel (02346) 15454604 ladislaocaputo@trigoklein.com.ar /// **ASESOR COMERCIAL:** Mariano

Curiale Cel. (02346) 15454614 marianocuriale@trigoklein.com.ar /// **URUGUAY:** Para adquirir semillas en Uruguay: www.klein.com.uy